

# အိမ်၌ ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းသော အသက်ရှူခြင်း



NATIONAL CENTER ON  
Early Childhood Health and Wellness

တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစင်တာမှ မိသားစုများအတွက် သက်ဝယ်ကလေးဘဝကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ

## ပန်းနာရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရန် ပါဝင်ကူညီပါ - သင့်အိမ်ကို ဆေးလိပ်ငွေကင်းမဲ့သော အိမ်အဖြစ်ထားပါ။

### ၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါသနည်း။

- ကလေးများသည် အချိန်တိုင်းတွင် ဆေးလိပ်ငွေကင်းမဲ့သောနေရာများတွင်သာ ရှိသင့်ပါသည်။
- တို့သည် ပန်းနာရောဂါဖြစ်ပွားစေသော မီးပွားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို သင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါသည်။
- စီးကရက်အငွေ့ နှင့် အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်အငွေ့တွင် ကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်သော အချို့သော ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။

### အီလက်ထရောနစ်စီးကရက် (သို့) vapes ဆိုသည်မှာ မည်သည့်နည်း။

အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်သည် အရည်များ နှင့် နီကိုဒ်အင်အရသာပါဝင်သော ရေငွေ့ကို လွှတ်ထုတ်သည်။ ၎င်းရေငွေ့သည် အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ချမှတ်ပါ။ ၎င်းရေငွေ့သည် ကလေးများ၏ အဆုတ်ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

### ပန်းနာရောဂါ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ပန်းနာရောဂါသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရှောင်ခြင်း နှင့် ကျဉ်းမြောင်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသော အခြေအနေမျိုး ဖြစ်သည်။ ပန်းနာရောဂါသည် ရင်ဘက်နာခြင်း၊ မောပန်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လူတို့ကို ချွဲသလိပ်သဖြင့် အသက်ရှူခြင်း/စကားပြောခြင်း နှင့် ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။

### Secondhand Smoke

#### ဆိုသည်မှာ မည်သည့်နည်း။

Secondhand smoke သည် လေထဲရှိ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ဆိုလိုပါသည်။ စီးကရက်များ၊ အီလက်ထရောနစ်စီးကရက် (သို့) vapes၊ ဆေးတံ နှင့် ဆေးပြင်းလိပ်မှ လူတို့ရှူသွင်းလိုက်သော ဆေးလိပ်ငွေ့ဖြစ်သည်။

### Thirdhand Smoke

#### ဆိုသည်မှာ မည်သည့်နည်း။

Thirdhand smoke သည် တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆေးလိပ်သောက်သုံးပြီး တောင်မှ အဝတ်အထည်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကျန်နေသော ဆေးလိပ်ငွေ့ဖြစ်သည်။



## သင့်ကလေးကို ကူညီနိုင်မည့် သင်ပြုလုပ်နိုင်သော အရာများ

- ပန်းနာရောဂါရှိသော ကလေးကို ကူညီနိုင်မည့် သင်ပြုလုပ်နိုင်သော အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုမှာ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းမဲ့သော အိမ်အဖြစ် ရှိရန် ဖြစ်ပါသည်။
- Secondhand smoke သည် ဘယ်တော့မှ စိတ်မချရပါ။
- Secondhand smoke သည် ရောဂါကူးစက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကလေးများသည် ပိုမိုငယ်ရွယ်ပြီး ကြီးထွားနေသေးသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Secondhand smoke သည် အရွယ်ရောက်လူများထက် ကလေးများကို ပို၍ တောင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။
- အခြားသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာများထက် ပိုပြီး ပန်းနာရောဂါအတွက် ကလေးများသည် မကြာခင် ဆေးရုံတက်ကြသည်။
- ပန်းနာရောဂါရှိသော ကလေးများသည် ပန်းနာရောဂါ

- မရှိသော ကလေးများထက် ပိုပြီး ကျောင်းပျက်ရက် ပိုများသည်။
- ကလေးတွင် ပန်းနာရောဂါရှိခဲ့ပါက လေထဲတွင် ရှိသော ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှောင်ခြင်းသည် ပိုမိုပြင်းထန်သော ရုတ်တရက် ပန်းနာရောဂါထခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- လေထဲတွင် ဆေးလိပ်ငွေ့ရှိသောနေရာ အနီးအနားတွင် နေခြင်းသည် ပန်းနာရောဂါမရှိသော ကလေးများအတွက် ပင်လျှင် ပန်းနာရောဂါကဲ့သို့သော လက္ခဏာမျိုး ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
- ဆေးလိပ်ငွေ့မှ ဓာတုပစ္စည်းများ (thirdhand smoke) သည် စီးကရက်မီးငြှိမ်းသွားပြီးနောက် လေထဲနှင့် သင့်အဝတ်အစား ပေါ်တွင် ရက်အတော်ကြာ (သို့) အပတ်အတော်ကြာ ရှိနေနိုင်ပါသည်။
- Thirdhand smoke သည် ဘယ်တော့မှ စိတ်မချရပါ။
- သင့်ကလေးအတွက် ကုဆရာဝန်သည် သင် (သို့) အခြားသူများကို ဆေးလိပ်ပြတ်အောင် ကူညီနိုင်ပါသည်။